




Che nome DAI ALLE TUE **CISTI?**

Scheda di classificazione dell'HS in base ai sintomi

CASI DI LIEVE ENTITÀ

Presenza di un unico o di alcuni foruncoli isolati, senza fistole o formazione di tessuto cicatriziale

Noduli dolorosi e ascessi situati nelle ascelle, inguine, sotto le mammelle, glutei e nella parte interna delle cosce. In genere, nella fase iniziale si assiste alla comparsa di noduli duri delle dimensioni di un pisello. Non di rado vengono erroneamente diagnosticati come normali foruncoli o acne.



CASI DI ENTITÀ MODERATA

Foruncoli ricorrenti che interessano diverse aree con formazione di tessuto cicatriziale e fistole

Quando le manifestazioni dell'idrosadenite suppurativa colpiscono in maniera persistente o ricorrente la stessa sede, può formarsi tessuto cicatriziale.



CASI DI ENTITÀ GRAVE

Noduli diffusi (alcuni delle dimensioni di palline da golf), con numerosi tragitti fistolosi collegati fra loro, che possono provocare la formazione di cicatrici e la secrezione di materiale purulento e maleodorante

Il decorso della malattia varia nel tempo. Talvolta gli ascessi possono risolversi spontaneamente, aprirsi verso l'esterno emettendo secrezioni purulente oppure peggiorare con il passare del tempo. Le aree colpite spesso emettono un odore sgradevole.

